

Received	2025/11/28	تم استلام الورقة العلمية في
Accepted	2025/12/24	تم قبول الورقة العلمية في
Published	2025/12/25	تم نشر الورقة العلمية في

تصنيف أنواع من الخنافس المائية Aquatic Coleoptera من فصيلة Dytiscidae في منطقة شحات وعنبة بشرق ليبيا

مناجي فوزي المصراطي، انصاف فوزي المصراطي وإبراهيم محمد علي
قسم وقاية النبات، كلية الزراعة، جامعة عمر المختار، البيضاء -ليبيا.

1- Manaji.fawzi@omu.edu.ly، 2- ansaaf.fouzi@omu.edu.ly

3- hdsipwwo0.63@gmail.com

الملخص

هدفت هذه الدراسة الى حصر وتصنيف بعض أنواع من الخنافس الغواصة من فصيلة Adephaga رتبة Dytiscidae في منطقتي عين الحفرة وعين عنبة بالجبل الأخضر خلال الفترة من شهر يونيو 2023 الى يونيو 2024، وكان الجمع كل أسبوعين وبشكل عشوائي من سطح الماء ومن بين النباتات المائية والأوراق الطافية بواسطة الشباك المائية وقد بينت نتائج الدراسة تسجيل أربعة أنواع من هذه الفصيلة *Laccophilus hyalinus* ، *Agabus biguttatus* ، *Hydroporus humilis* ، *confluens* ، *Hygrotus* ، اعتمد تصنيفها على الصفات الخارجية لشكل الخارجي للجسم والأعضاء التناسلية الذكرية.

الكلمات المفتاحية: الخنافس المائية، Dytiscidae ، Aquatic Coleoptera ، الجبل الأخضر ، ليبيا.

Taxonomic on Aquatic Coleoptera species from Dytiscidae in Anbasa and shahat region‘ eastern Libya

Managi Fawzi Al-Msrati· Ansaf Fouzi Almusrati and Ibrahim Muhammad Ali

Department of Plant Protection· Faculty of Agriculture· Omer Al-Mukhtar University El-Beida- Libya

1- Manaji.fawzi@omu.edu.ly, 2 - anssaaf.fouzi@omu.edu.ly

3- hdsipwwo0.63@gmail.com

Abstract

This study aim to survey and identify the species of Aquatic Coelotera belongs to the family Dytiscidae· sub- order Adephaga from Ain Barghu Anbasa and Ain Al hofra shahat· Al Jabal Al Akhdar region‘ during the period from June 2023 to July 2024·samples was conducted biweekly and randomly from the water surface ‘among aquatic plants and from floating leaves using aquatic nets·the results of this study showed the recording of four species: *Laccophilus hyalinus*· *Hygrotus confluens* ·*Hydroporus humilis* and *Agabus biguttatus*· their identification was based on characters of the body morphology and male genitalia.

Keywords: Aquatic Coleoptera· Dytiscidae· Al Jabal Al Akhdar· Libya.

المقدمة

تعد الخنافس المائية Coeloptera من أكبر الرتب الحشرية المائية المتواجدة في جميع أنواع الاوساط المائية العذبة تنوعا،(Garrido and Munilla 2008) اذ سجل منها حوالي 400.000 نوع منتشرة في جميع انحاء العالم ،(Jach and Balke 2008) تعد من أكثر فصائل Adephaga من حيث عدد الاجناس، حيث ينتهي فصائل Dytiscidae من أكثر فصائل من حيث عدد الجنسيات، حيث ينتهي لها أكثر من 181 جنسا و 4223 نوع موصوفا في العالم وتقسم هذه الفصيلة الى عشرة فصائل فرعية (Nilsson and Hajek 2022:2024)، وأشارت عدة دراسات الى ان الخنافس الغواصه تعيش في المياه العذبة وتقطن المياه الساكنة والمياه الجارية، حيث تعيش الاطوار الثلاثة (البيضة واليرقة والحشرة الكاملة) في الماء، اما الطور العذراء

فيوجد بالتربيه الطينية القريبة من الماء، غالبا تكون اليرقات والمحشرات الكاملة سباخات ماهرة ومقترسات نشطة، وتشكل جزءاً منها في مكونات السلسلة الغذائية (Balke, 2005). Zalat et al. (2000) دراسة لتصنيف وتوزيع وبيئة الخنافس الغواصية المصرية سجل 65 نوعا تدربت في 27 جنسا، كما اعد (Salah and Regil Cueto 2014a) قائمة ذكر فيها 31 نوعا تدربت في 12 جنسا وسجل (Salah and Regil Cueto 2014b) 49 نوعا دراسة لحالة وتوزيع الخنافس 16 جنسا. كما اجري (Benamar et al. 2021b)، دراسة لحالة وتوزيع الخنافس الغواصية وذكر فيها 92 نوع متواطنا في المغرب، 36 نوع مهددا بالانقراض، و4 أنواع منها مهددة بشكل كبير، في حين بينت نتائج (Taybi et al. 2017) دراسته بشمال شرق المغرب تسجل 39 نوعا، وفي دراسات عديدة قام (Touaylia et al. 2011A، 2017)، بجمع العديد من البيانات عن بيئه وتوزيع الخنافس في شمال تونس حيث ذكر 46 نوع تتنمي الى 22 جنسا، تم اجري دراسات محلية قليل جدا عن الخنافس المتواجدة في ليبيا، حيث أظهرت دراسة (Zavattari 1934) عن المحشرات المنتشرة في أقاليم ليبيا برقة، فزان وطرابلس تسجيل عشرة أنواع من Dytiscidae، Laccophilinae Colymbetinae Hydrocorinae، Dytiscinae. ونظرا لقلة الدراسات المتعلقة بتعريف وتصنيف أنواع الخنافس المائية الغواصية المتواجدة في ليبيا، هدفت هذه الدراسة الى حصر وتصنيف الأنواع من هذه الفصيلة.

مواد وطرق البحث

جمعت الخنافس المائية خلال المدة من يونيو 2023 الى يوليو 2024 من عين الحفرة منطقة شحات وعين برغو منطقة عنابه الجبل الأخضر والتي تقع بين دائريتي عرض 35.32°S و 32.48°S وبين خطى طول 15.22°E و 15.90°E، وكان الجمع كل أسبوعين وبشكل عشوائي من سطح الماء ومن بين النباتات المائية والأوراق الطافية بوسطة الشباك المائية ونقلت المحشرات بعد جمعها في أكياس بلاستيكية الى المختبر وعزلت وسجل اعداد كل نوع منها ومناطق تواجدها وتاريخ جمعها، حفظت المحشرات المعرولة في كحول 75%، صنفت المحشرات وفقا للمصادر (Bistrom et al. 2015-2000)، (Ribera et al. 2003)، (Fery 2001)، (Zalat et al. 2003).

، في قسم وقاية النبات، كلية الزراعة جامعة عمر المختار، وتم تأكيد تصنيفها من متحف الجامعة الأردنية بالأردن، تم اخذ القياسات باستخدام الميكروسكوب ووصف الحشرات من خلال وصف الرأس،(Head) الجناح الغمد، (elytron) الارجل الخلفية،(Hindlegs) الصفيحة البطنية السفلية الطرفية،(Apical ventrites) القضيب (penis) و الفصوص التناسلية الجانبية للقضيب (Paramere) وتم تصوير العينات بواسطة جهاز من النوع .S24 Ultra

النتائج

اظهرت النتائج ان الأنواع الأربع المسجلة في هذه الدراسة تدرجت في ثلاثة فصائل فرعية

Laccopilinae ، *Laccoplius hyalinus*(De Geer 1774)


1934) ،*Hydroporus humilis* (Klug 1787) و *Hygrotus confluens* (1787) تتبعان الي 1795)، *Agabus biguttataus*(Olivier، ، *Hydroporinae* Suborder Adephaga تحت رتبة Dytiscidae، من فصيلة Colymbetinae. الى Coleoptera ورتبة وتم وصف الطور البالغ لأنواع الأربعه اعتمادا على الصفات الخارجية لشكل الجسم والأعضاء التناسلية الذكرية.

1- فصيلة Dytiscidae

1- تحت فصيلة *Hydroporinae*


***Laccoplius hyalinus* (De Geer، 1774)-1**

الوصف: طوله 6 ملم، (شكل 1 أ،ب،ج) الراس بيضاوي بلون بنى مصفر، مع وجود بقعه بنية غامقة عريضة اعلى قمة الراس، العيون المركبة سوداء اللون، قرن الاستشعار 0.8 ملم خطي رفيع مكون من 11 عقلة، بلون بنى مصفر، أجزاء الفم ذات لون بنى فاتح، صفيحة الدرع Scutellum صغيرة للغاية، الحلقة الصدرية الأولى pronotum متراوحة وعريضة من الوسط ، بلون بنى مصفر لامع ومنقرفة بنقر منتظمة مع حافة سوداء واضحة على الجزء الخلفي، الصدر مستقيما الى حد ما، الغمد 4.9 ملم بلون بنى مصفر مع وجود نقاط دقيقة سوداء متباude في المنتصف الغمد،



شكل 1. (أ). الأنثى (ب-ج). منظر جانبي وبطني لذكر *Laccophilus hyalinus*

يغطي الغمد البطن عدا جزء من الاسترنة البطنية الأخيرة تكون ظاهرا (شكل 2.أ)، الارجل الامامية والوسطى ذات لون بنى مصفر مزودة بشعيرات قصيرة صفراء اللون على الساق والرسغ، الرسغ مكون من 4 عقل، الارجل الخلفية طولها 4 ملم لونها بنى مصفر، تحمل الساق ثلاثة اشواك جانبية، المهماز الخارجي القمي على طرف الساق أطول من المهماز الداخلي، الرسغ مكون من 5 عقل ومزود بشعيرات طويلة (شكل 2.ب)، البطن بلون بنى مصفر مكونه من 5 حلقات، الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (Apical ventrites) مسطحة ومخططة بدقة طولها 1 ملم (شكل 2.ج)، الأعضاء التناسلية الذكرية القضيب (penis) منجلي الشكل بلون بنى محمر الى اصفر بطول 1 ملم (شكل 2.د، ه)، الفصوص التناسلية الجانبية (Paramere) بيضاوية متباولة بلون بنى محمر غامق اعمق من القضيب طولها 0.5 ملم (شكل 2.و).



شكل 2 . (أ). يبين شكل الغمد(ب). الرجل الخلفية (ج). الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (د-ه). منظر ظاهري وجانبي للقضيب (و). الفصوص التناسلية الجانبية.

2- تحت فصيلة *Hydroporinae*

Hygrotus confluens (Fabricius, 1787) -1

الوصف: طوله 4.3 ملم (شكل 3 أ، ب، ج)، الرأس كروي الشكل بلونبني مصفر مع وجود بقعة سوداء عريضة اعلى قمة الرأس بين العيون المركبة، قرن الاستشعار 0.9 ملم خيطي مكون من 11 عقل، صفيحة الدريع Scutellum غير واضحة، الحلقة الصدرية الأولى pronotum بلونبني مصفر مع وجود شريط اسود يكون من الخلف اعرض من الجزء الامامي، الصدر مستقيما الى حد ما ولا ينحرف مباشرة خلف الرأس، الغمد طوله 2 ملمبني مصفر مع وجود 4 خطوط عريضة سوداء وشعيرات كثيفة على جوانب السفلية الخارجية .




(ج)

(ب)

(أ)

شكل 3. (أ). الأنثى (ب-ج). منظر ظاهري وجانبي لذكر *Hygrotus confluens*

يغطي الغمد البطن تماماً(شكل 4.أ)،الارجل الامامية والوسطى ذات لون بنى مصفر مزودة بشعيرات قصيرة بنية اللون على الساق والرسع ،الرسغ مكون من 4 عقل، الارجل الخلفية طولها 2.5 ملم بلون بنى مصفر ،تحمل الحرقفة الخلفية أعضاء الصرير، يحمل طرف الساق مهماز قمي خارجي وداخلي رفيع، الرسع مكون من 5 عقل ومزود بشعيرات طويلة(شكل 4.ب)، البطن بلون بنى غامق مكونه من 5 حلقات، الصفيحة البطنية السفلية الطرفية(Apical ventrites) مدوره بشكل عريض قليلاً بلون بنى طولها 0.4 ملم(شكل 4.ج)، القضيب(penis) ابرى مسنن مقوس الشكل، بلون بنى لامع، بطول 0.5 ملم(شكل 4.د،ه)، الفصوص التناسلية الجانبية مثلثة تقريباً في وسطها خط بنى واضح (Paramere) بطول 0.4 ملم(شكل 4.و).



شكل 4. (أ). يبين شكل الغد (ب). الرجل الخلفية (ج). الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (د-ه). منظر ظاهري وجانبي للقضيب (و). الفصوص التناسلية الجانبية.

***Hydroporus humilis* (Klug, 1934)-2**

الوصف: طوله 5 ملم(شكل 5 أ،ب)، الرأس بيضاوي الشكل بلون اسود مع وجود بقعة بنية بشكل عريض اعلى قمة الرأس، العيون المركبة بلونبني داكن، قرن الاستشعار 1.2 ملم خيطي مكون من 11 عقل، متدرج في اللون ما بين البني الفاتح الى البني الغامق، يشكل الرأس مع الجانب السفلي للصدر زاوية واضحة، صفيحة الدرع Scutellum غير واضحة، الحلقة الصدرية الأولى pronotum بلونبني مائل للسواد ومحاطى بشعيرات قصيرة و كثيفة، الغد طوله 4 ملم بلونبني فاتح مع وجود نقر دقيقة بنية غامقة وشعيرات كثيفة و مت坦رة وقليلة على الجوانب، يغطي الغد البطن تماما(شكل 6.أ)، الارجل الامامية والوسطى ذات لونبني غامق مزودة بشعيرات قصيرة بنية اللون على الفخذ والساقد، الرسغ مكون من 4 عقل، الارجل الخلفية طولها 3.5

ملم بلونبني ، والاشواك القمية الداخلية والخارجية لطرف الساق رفيعة، الرسغ مكون من 5 عقل ومزود بشعيرات طويلة(شكل 6.ب)، البطن بلونبني غامق مكونه من 5 حلقات، الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (Apical ventrites) مدورة ومحدبة من وسطها وعليها شعيرات قليلة جدا على الجوانب، لونها متدرج بين البنى الغامق والبني الفاتح، طولها 1 ملم(شكل 6.ج)، الأعضاء التنااسلية الذكرية القضيب عريض ومدبب بلونبني غامق، بطول (penis) 0.6 ملم(شكل 6.د،ه)، الفصوص التنااسلية الجانبية (Paramere) مثلثة الشكل بلونبني مصغر بطول 0.5 ملم(شكل 6.و).




(ب)



(أ)

شكل 5. (أ). الأنثى (ب). منظر ظهي لذكر *Hydroporus humilis*



شكل 6. (أ). يبين النقر على الغعد (ب) الرجل الخلفية (ج) الصفيحة البطنية السفلية
الطرفية (د-ه) منظر ظاهري وجانبي للقضيب (و) الفصوص التناسلية الجانبية.

3- تحت فصيلة *Colymbetinae*


Agabus biguttatus (Olivier, 1795)-1

الوصف: طول 10 ملم (شكل 7أ، ب، ج)، الرأس بيضاوي الشكل، اسود محمر مع وجود بقعه بنية غامقة عريضة اعلى قمة الراس ،العيون المركبة بلونبني محمر ، قرن الاستشعار 3 ملم خيطى مكون من 11 عقل، أجزاء الفم ذات لونبني محمر. صفيحة الدرع Scutellum واضحة، الحلقة الصدرية الأولى pronotum بلون اسود محمر لامع، استرنة الصدر الامامي تحمل زائدة مثلثة الشكل (prosternal processes) تتمتد الي ما بين الحرافق الوسطى، الغمد طوله 7 ملم املس ولا ينبع بلون اسود محمر الي بني غامق مع وجود بقعه بنية فاتحة في الوسط، يغطي الغمد البطن عدا جزء من الاسترنة البطنية الأخيرة تكون ظاهرا بينما عند الأنثى فالغمد يغطي البطن تماما(شكل 8أ)، الارجل الامامية والوسطى ذات لون اسود محمر مزودة بشعرات قصيرة سوداء اللون على الفخذ

والساقي، الرسغ مكون من 5 عقل، الارجل الخلفية طولها 6 ملم بلونبني محمر، تحمل الساق عدد من الاشواك على الجانبين، المهماز الداخلي على طرف الساق أطول واعرض من الخارجي، الرسغ مكون من 5 عقل ومزود بشعيرات طويلة(شكل 8.ب)، البطن بلونبني محمر اليبني غامق مكونة من 5 حلقات، الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (Apical ventrites) طولها 1.2 ملم، مسطحة ومنقره بنقر موزعه على خطوط طولية مع شعيرات قليلة متباينة لكنها اكثركثافة على نهاية الصفيحة(شكل 8.ج)، الأعضاء التناسلية الذكرية القضيب (penis) مقوس بقمة ابرية بلونبني فاتح الى اصفر بطول 3 ملم(شكل 8.ه)، الفصوص التناسلية الجانبية (Paramere) مقوسة ذو قمة مسننة مزودة بشعيرات طويلة وكثيفة على الحواف بلونبني فاتح الىبني مصفر طولها 2.5 ملم(شكل 8.و).



شكل 7 . (أ)الأنثى (ب-ج). منظر ظاهري وبطني لذكر *Agabus biguttatus*



شكل . 8 (أ). يبين شكل الغمد(ب). الرجل الخلفية (ج). الصفيحة البطنية السفلية الطرفية (د-ه). منظر ظاهري وجانبي للقضيب (و). الفصوص التناسلية الجانبية.

المناقشة

من خلال النتائج المتحصل عليها، تم تسجيل *Hygrotus Laccophilus hyalinus* و *Agabus biguttatus* و *Hydroporus humilis confluens* و اتفق تسجيل هذه الأنواع مع ما ذكره Zavattari (1934)، صفت الأنواع المتحصل عليها إلى رتبة غمديه Suborder Adephaga Foster حسب الأجنحة Coleoptera وتحت رتبة Dytiscidae (and Friday 2011)، ثم صفت إلى فصيلة Laccophilinae Colymbetinae)، (Hydroporinae حسب المفاتيح التصنيفية: (Bistrom *et al.*, 2015–Fery, 2003–Ribera *et al.*, 2001–Zalat *et al.*, 2000)

حيث تميزت فصيلة Dytiscidae بجسمها البيضاوي، قرون الاستشعار مكونه من 11 عقلة متساوية تقريباً في الحجم، الجناح الغمدي باللون البني المصفر إلى البني المحمرا فاللائم، يتواجد على الغمد نقر وبقع وشعيرات متاثرة، الصدر الخلفي أكبر من الصدر

الامامي والواسطى، الارجل الوسطى والخلفية متباينة أكثر من بعد الموجود بين الارجل الامامية والواسطى وهذه ناتج من تضخم الحرقفة الخلفية التي تعطى الجزء الأكبر من السطح السفلي للصدر وتقسم الحلقة البطنية الاولى الى قسمين منفصلين، الارجل الخلفية اطول من الارجل الامامية والواسطى وتكون مفلطحة قليلاً وعلى حافتها شعر طویل وكثيفه (Kehl ، 2023). كما أظهرت النتائج المتحصل عليها ان الانواع *Agabus biguttatus* و *Laccopplius hyalinus* البالغ في عين برغو وعين الحفره، اما الانواع *Hygrotus confluens* و *Hydroporus humilis* تم العثور على افرادها من الطور اجراءها (Zavattari, 1934) عن الحشرات المنتشرة في أقاليم ليبيا برقة، فزان وطرابلس، حيث تدل هذه النتائج الي ان الانواع *Agabus biguttatus* و *Laccopplius hyalinus* سائدة في عين الحفرة بمنطقة شحات، اما الانواع الأخرى فقد سجل وجودها في نفس الدراسة مع الاخذ بعين الاعتبار اختلاف مناطق الدراسة.

الخلاصة

من خلال دراسة أنواع الخنافس المائية **Aquatic Coleoptera** من فصيلة **Dytiscidae** في منطقة شحات وعنبسة بالجبل الأخضر تبين وجود أربعة أنواع من الخنافس المائية الغواصه تدرجت في ثلاثة فصائل فرعية وهي *Laccopplius*, *Agabus*, *Hydroporus humilis*, *Hygrotus confluens*, *hyalinus* *biguttatus* ، صنفت اعتماداً على الصفات الخارجية لشكل الجسم والأعضاء التناسلية الذكورية، و تعتبر دراسة الخنافس المائية في ليبيا نادرة للغاية، و تتأثر توزيع هذه الحشرات بعدة عوامل بيئية من ابرزها نوعية المياه وتسهم هذه العوامل في حدوث اختلاف في كثافة الخنافس المائية بين المناطق، والذي ينعكس على توازن النظم البيئية المائية.

المراجع:

- Balke, M. (2005). "Dytiscidae Leach, 1915. In:Handbook of Zoology, Vol. IV Arthropoda: Insecta. Part 38. Coleoptera, Vol. 1: Morphology and Systematics (Archostemata, Adephaga, Myxophaga, Polyphaga partim)". pp, 90-116.

- Benamar,L., Bennas,N., Hassoun,M and Millá,A. (2021). "Threatened endemic water beetles from Morocco. Journal of Insect Conservation", 25(3) 465-477.
- Biström,O, Nilsson,A,N and Bergsten,J. (2015). "Taxonomic revision of Afrotropical Laccophilus Leach, 1815(Coleoptera, Dytiscidae)", ZooKeys, 542: 1–379.
- Fery,H .(2003). "Dytiscidae:V. Taxonomic and distributional notes on Hygrotus Stephens, with emphasis on the Chinese fauna and a key to the Palearctic species,in Jach MA,Ji L.Water Beetles of China, III", Zoologisch-Botanische Gesellschaft in Österreich and Wiener Coleoptera ologenverein wien, p133- 193.
- Foster G.N and Friday L.E. (2011). "Keys to adults of the water beetles of Britain and Ireland", Handbooks for the identification of British Insects 4(5a), Royal Entomological Society, pp 144.
- Garrido, J. and Munilla, I. (2008)." Aquatic Coleoptera and Hemiptera assemblages in three coastal lagoons of the NW Iberian Peninsula: assessment of conservation value and response to environmental factors", Aquatic Conserv. Mar.Fresh. Ecosyst, 18: 557 – 569.
- Jach, M.A. and Balke, M. (2008). "Global diversity of water beetles (Coleoptera) in freshwater", Hydrobiologia, 595: 419-442.
- Kehl, S. (2023). "Morphology, Anatomy and Physiological aspects of Dytiscids.In Ecology, Systematics and the Natural history of predaceous diving Beetles (Coleoptera;Dytiscidae)", Spring international,pp,225-251.
- Nilsson,A.N and Hajek, J. (2024). "A World Catalogue of Family Dytiscidae or the Diving Beetles (Coleoptera,Adephaga)", 323pp. <http://www.waterbeetles.eu>
- Nilsson, A.N. and Hajek, J. (2022)." A world catalogue of the family Dytiscidae, or the Diving Beetles (Coleoptera, Adephaga)" <http://www.waterbeetles>
- Ribera, I., Hernando, H. and Aguilera, P. (2001). "*Agabus alexandrae* sp. n. from Morocco, with a molecular phylogeny of the Western Mediterranean species of the *A. guttatus* group

(Coleoptera:Dytiscidae)”, Insect Systematics and Evolution,32 (3):253-262.

Salah, M. and Regil Cueto, J.A.(2014a).” An annotated checklist of the aquatic Adephaga (Coleoptera) of Egypt. I. Dytiscidae: Agabinae,Colymbetinae, Copelatiniae, Dytiscinae and Laccophilinae”, Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 54: 145-155.

Salah, M.and Regil Cueto, J.A. (2014b).” An Annotated Checklist of the Aquatic Adephaga (Coleoptera) of Egypt II. Family Dytiscida: Hydropoinae”, Boletín de la Sociedad Entomológica Aragonesa, 54, 293–305.

Taybi, A.F., Mabrouki, Y., Chavanon, G., Berrahou, A. and Millán, A. (2017). “New data on the distribution of aquatic beetles from Morocco (Coleoptera, Adephaga: Gyrinidae, Halipidae and Dytiscidae)”, Baltic J. Coleopterol, 17(1) 83-106.

Touaylia, S.(2017). “Thoughts on Water Beetles in a Mediterranean Environment. Insect Physiology and Ecology,1p”

<http://www.intechopen.com/books/insect-physiology-and-ecology>

Touaylia, S., Garrido, J., Bejaoui M. and Boumaiza, M.(2011a). “Altitudinal distribution of aquatic beetles (Coleoptera) in Northern Tunisia: relationship between species richness and altitude”, The Coleopterists Bulletin, 65(1): 53–62

Touaylia, S., Garrido, J. and. Boumaiza. M.(2011b).”Chorological and Phenological Analysis of the Water Beetle Fauna (Coleoptera: Adephaga and Polyphaga) of Northern Tunisia” The Coleopterists Bulletin, 65(3):315-324.

Zavattari, E.(1934). “Prodromo della fauna della Libia. pubblicato sotto gli auspice del Ministe o delle colonie e della nive sit di avia”, p386-393

Zalat, S., Saleh, R., Angus, R and Kaschef, A. (2000). “Diving beetles (Coleoptera: Dytiscidae and Noteridae) of Egypt”, Egyptian Journal of Natural History, 2: 1-107.